

# éKO jardiniers de la Souffel

20 décembre 2020



## La vie du Réseau

**La lettre d'informations sur le jardinage prend son rythme automne/hiver d'octobre à février, avec des parutions les 5 et 20 de chaque mois.**

## Les travaux au jardin !

### Espace "LÉGUMES"

Les choux de Bruxelles sont récoltés dès les premières gelées jusqu'en mars. Ce légume d'hiver est extrêmement résistant au froid et ne nécessite aucune protection pour l'hiver. Il est meilleur après les premières gelées. Les "petites pommes" sont récoltées dès qu'elles ont 3 cm de diamètre et au fur et à mesure des besoins.

Avant, ces choux sont semés de fin avril à mai en pépinière (espace réservé aux semis de légumes qui sont repiqués après plusieurs semaines en pleine terre). Au stade 4 feuilles, ils sont repiqués de mi-mai à fin juin à 70/100 cm en tous sens, en les enterrant assez profondément. Comme ces choux restent très longtemps en place (plus de 6 mois), le jardinier peut semer ou repiquer d'autres légumes sur et entre les rangs (salades...).



### S'embrasser sous le gui !

Attention la baie est toxique. L'apparition de gui en quantité peut être le signe de la mauvaise santé d'un arbre. Un ou deux pieds n'épuisent pas l'arbre. Plus, il est important de l'éliminer. Comment faire ? Couper le gui au ras de la branche avec une serpette. Ensuite, il est nécessaire de creuser en profondeur dans la branche pour enlever la partie du bois atteinte. S'il reste des sucoirs, une nouvelle touffe peut apparaître dès l'année suivante. Si les branches sont envahies, mieux vaut les couper avec une scie d'arboriculteur.




## Pour en savoir plus !

- Le FACE BOOK : Jardin et biodiversité en Alsace

Les rendez-vous de la Souffel !

Plus d'infos sur : <https://www.kochersberg.fr>

### Espace "FRUITS et PETITS FRUITS"



### Espace "FEUILLES et FLEURS"

Les asters apprécient la lumière, voire le soleil si la terre reste fraîche en été (paillage, plantation en massif avec d'autres plantes...). Tous les sols leur conviennent. Les asters ne supportent pas l'humidité stagnante en hiver. L'automne est la meilleure période de plantation. Le jardinier peut acheter ces plantes en godets ou en récupérer par division de touffes. Leur croissance est très rapide. Il faut compter 3 pieds au m<sup>2</sup> pour les plus grands, 4 ou 5 au m<sup>2</sup> pour les plus petits. Comme toute plantation de vivaces en godet, il faut tremper préalablement la motte pour que le terreau soit gorgé d'eau. Ensuite, démêler délicatement les racines trop serrées. Creuser un trou à la dimension de la motte, déposer au fond du trou un peu de compost bien décomposé ou du terreau de plantation puis tasser bien autour du pied. Enfin, pailler avec des feuilles mortes ou du broyat de déchets verts. Les asters sont rabattus de moitié en juin pour favoriser leur tenue et pour favoriser la floraison. Dès l'automne, les tiges sèches sont rabattues. Les déchets cisaillés sont laissés sur place. Toutefois, il est conseillé de rabattre les tiges qu'à la fin du mois de février. Les oiseaux pourront ainsi se nourrir des graines durant l'hiver.

### CONTACTS:

[lesjardiniersdelasouffel@gmail.com](mailto:lesjardiniersdelasouffel@gmail.com)

**Laura Perrin**

Communauté de Communes du Kochersberg  
[Laura.PERRIN@kochersberg.fr](mailto:Laura.PERRIN@kochersberg.fr)

**Laurent Mergnac**

Mission eau du Bassin de la Souffel  
[laurent.mergnac@sdea.fr](mailto:laurent.mergnac@sdea.fr)